Trécourt.

observations sur Léxomphale

par M. trécourt, correspondant de l'Académie.

Léxomphale est moins frequente dans les deux sexes que la hernie ainguinale ce qui peut etre na point autant fixé Lattention des praticiens qui setendent beaucoup sur celle cy, et disent peu de chose de Léxomphale, quils paroissent avoir confondue avec les hernies en general; La situation et la structure differente des parties, mont suggeré des refflexions que jay mis en pratique avec succés.

Dans La hernie ainguinale Le sac herniaire et cequil contient passe par Les anneaux des muscles transverses petit et grand obliques, Lesquels sont situés de façon que Laponevrose du petit oblique couvre Lanneau du muscle transverse, et Laponevrose du grand oblique couvre Lanneau du petit oblique, cequi fait que Les brayeres ou bandages, inventés par Les anciens pour contenir les hernies, et perfectionnés par les modernes reussissent communément, pourvû quils soient bien faits et appliqués convenablement, parceque Lextremité de la plotte se trouve appuyée sur Lós pubis, tandis que par sa convexité elle comprime Les anneaux susdits; il est facile de concevoir tout Lavantage de ce point dappuis, mais il nén est pas de meme de Léxomphale; Lanneau umbilical est situé au milieu et entre les muscles droits Lesquels ont plusieurs interfections tendineuses que les anciens ont appellez ènervations, parcequón pretent que ces interfections empechent Les trop grands efforts de ces muscles sur les parties contenues; ils sont separés Longi-tudinalement par la Ligne blanche, qui est une bande aponevrotique composée ou formée des aponevroses des muscles de Lábdomen.

Lorsque par une cause interne ou un effort violent, ces muscles et ces aponevroses ont souffert une extention

ARC 14d.35 n°2

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

considerable, et ensuite un relachement capable de permettre La sortie des parties contenues par La dilatation de Lanneau umbilical, est cequon appelle Exomphale.

De tous Les bandages que jay vû pour contenir ces sortes d'hernies il nen est point qui maie paru remplire Lindication, ny les vües quon setoit proposées. on se sert ordinairement d'une plotte demie sphérique, dont La convexité appuye fortement sur Lanneau umbilical. on conçoit facilement que cette espece de tampon (joint a la mollesse ou flaxité des parties, et a Leur peu de resistance, aidé par le mouvement de la respiration) doit necessairement causer une plus grande dilatation de Lanneau, favoriser La sortie des parties qui y trouvent moins de resistance, et produire a La fin une incommodité d'autant plus facheuse quelle peut devenir funeste: comme je lay vû a un religieux dont Lexomphale etoit aussi grosse que la teste d'un Enfant et adherente de toutes parts; Lorsque je le vis il y avoit quatre jours quon Lui avoit appliqué pour bandage, une Large plaque de plomb, de figure ronde, entourée de peau de mouton chamoisée, dans laquelle plaque on avoit fabriqué une concavité propre a Loger La tumeur; La fraicheur de ce metail, et Les particules qui sen etoient detachées par La chaleur de la peau, avoient occasionnez a ce pauvre religieux un colique affreuse que je traitai comme celle des peintres, et au Lieu de sa plaque, je lui ajustai un suspensoir. jay appris un an apres quil etoit mort d'une hydropisie de poitrine.

Dans le mois d'octobre 1767, un soldat du Regiment de Berwick, vint a Lhopital pour une Exomphale grosse comme un oeuf de dinde avec des douleurs énormes accompagnées de vomissemens, je le fis saigner plusieurs fois, et prescrivis des cataplasmes qui firent disparoitre La tumeur et Les accidens. Le chirurgien major dece Regiment etoit d'avis quon Lui fit Lopération, parceque ce soldat ne pouvoit plus supporter son bandage ordinaire, et quil ne pouvoit se lever ny meme sasseoire sur son Lit, que la tumeur ne parut tout de suite, ce qui etoit le signe du retour des autres accidens, de

sorte quil etoit obligé de rester toujours couché sur le dos; mais comme le succès n'est pas toujours aussi avantageux dans L'operation de L'exomphale que dans le bubonocele, je tentai differens moyens pour contenir Les parties rentrées dans Leur situation naturelle, Lesquels ne reussissoient pas mieux que le bandage quil portoit depuis plus d'un an et qui Lui avoit cependant bien servi dans ces premiers tems.

apres avoir fait les reflexions que je viens d'exposer j'appliquai Les deux mains sur les parties Latérales de la region umbilicale tendantes a rapprocher Les muscles de L'abdomen de la Ligne blanche, et avec les extremités de mes doigts je faisois rentrer en dedans les muscles droit, et les empechois de s'etendre au dehors, dans le tems de L'inspiration; je fis faire la meme manoeuvre au malade et le fis sortir de son Lit, tenant ses mains dans la meme position ou je les avois placées; il m'avoua s'appercevoir d'un grand soulagemt. et L'exomphale ne parut point pendant tout le tems que ses mains furent dans cette situation. j'imaginai en consequence de lui faire un bandage capable de remplir mes vües; il s'agissoit de rapprocher Les muscles droits L'un de L'autre et de les maintenir de façon que les mouvemens du corps et de la respiration ne puissent Les éloigner assez pour donner passage aux parties contenües. son regiment devoit partir, et on etoit decidé a le transporter sur Les chariots, cequi m'empecha de donner a ce bandage La perfection dont il est susceptible.

Je pris une bande de futaine (faute de cuire) Large de quatre pouces, ~~aux~~ a chaque Extremités de la quelle j'attachai une plotte Longitudinale garnie de coton, comme aux brayeres ordinaires, trois courroyes a L'une des extremités de cette bande, et trois boucles a L'autre de sorte que le bandage posé et serré par le moyen des boucles et courroyes il y avoit environ un pouce d'interval entre les deux plottes Longitudinales suivant La direction des muscles droits. aussitot que ce bandage fut placé, ce soldat se Leva et fit plusieurs tours dans la salle sans aucune incommodité au contraire il se sentoit les reins fort affermi: il ne se remit plus au Lit que pour y prendre le repos ordinaire il partit avec Le Regiment et a fait La route a pied de Rocroy a Dunkerque

Depuis ce tems là je n'ay point eu d'occasion de réiterer cette methode si simple et si avantageuse, mais je suis persuadé qu'elle réussira toujours avec satisfaction, pourvû

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

quil ny ait point d'adherence; je crois meme qu'on pourroit l'employer avec succes dans les hernies ventrales, ou la meme manoeuvre est indiquée, et que par son moyen on parviendroit, sinon a guerir radicalement les Exomphales naissantes, dumoins a en empecher les progrets.

on concoit que par cette manoeuvre on tend a rapprocher non seulement les parties laterales du ventre, et a fermer pour ainsi dire l'anneau umbilical, mais encore a conserver ou a retablir le ressort des parties contenantes; trois objets qui remplissent toutes les indications dans cette facheuse incom-modité; au lieu que par la methode ordinaire, la plotte demie spherique appliquée sur l'anneau umbilical, agit dans les commencemens, ou premiers tems, comme obturateur, mais insensiblement elle dilate l'anneau, écarte de plus en plus les muscles droits, et affoiblit l'élasticité des parties aponevrotiques.

Les moyens qu'on employe avec precipitation sont ordinai-rement susceptibles de perfection ulterieure, celui cy est bien dans ce cas. je voudrois au lieu d'une bande simple de futaine, me servir de celle de cuir doublée de futaine ou de toile (coupée par le milieu pour l'attacher par derriere avec des cordons ou couroyes afin de la maintenir dans une longueur toujours egale) et placer entre les deux une bande d'acier elastique, tres mince, de chaque coté, a laquelle on donneroit une forme propre a remplir l'objet de réunion des parties contenantes; c'est a dire que la branche droite avec la gauche, feroient l'effet des deux mains posées sur les parties laterales de la region umbilicale, et les deux plottes longitudi-nales feroient celui de l'extremité des doigts pour faire rentrer en dedans les muscles droits, en serrant les dites plottes par le moyens des boucles et des couroyes.

Permettez, Messieurs, que j'ajoute cy quelques reflexions relatives a la reduction des hernies des Enfans mâles.

Il n'y a presque point de ville, bourg, ou village ou il n'y ait des femmes qui ont la reputation d'etre adroites pour la reduction des hernies des Enfans; elles commettent souvent des bevües grossieres par le peu de connoissance qu'elles ont de la situation et structure des parties sur lesquelles elles operent

La mauvaise methode d'émmailloter, ou plutot degarotter Les Enfans, donne trop souvent occasion d'y avoir recours. dans cette manoeuvre. les Emmailloteuses ont grand soins de relever et retrousser les bourses aux Enfans mâles, de sorte que arrive souvent qu'un des testicules etant comprimé remonte jusqu'au dela de L'anneau du grand oblique, ce qui cause des douleurs a L'Enfant qui le font crier, sans que rien puisse L'appaiser; on le démaillote, et on trouve une petite tumeur sans inflammation dans L'aine, mais cependant fort douloureuse; on ne manque point d'appeller cette femme prétendüe adroite (je serois faché de citer des chirurgiens a qui cette bevüe en arrivé) qui decide que c'est une hernie, elle fait son possible pour La reduire, plus elle manie ce testicule plus elle L'irrite et enfin Le dispose a s'enflammer; elle applique ensuite un bandage qu'elle a grand soin de bien serrer pour qu'il reste en place trois ou quatre jours, heureux s'il se trouve aussitot imbibé d'urine pour obliger a le changer, et plus heureux encore, si le testicule reprend sa situation naturelle; pour Lors on n'hezite point a se feliciter d'avoir eu recours a cette femme: mais si malheureusement Le testicule se tuméfie et s'enflamme dans L'anneau il en arrive des accidens capables de faire perir L'enfant.

Il y a quelques années que je fus appellé pour en voir un qu'on prétendoit avoir une hernie depuis huit jours il vomissoit tous ce qu'il prenoit, je fus temoins de plusieurs convulsions en moin de tems qu'il n'en falut pour le démailloter, je trouvai en effet dans L'aine de L'enfant une tumeur grosse Comme un petit oeuf de poule, fort dure et Enflammee, et si douloureuse, qu'a peine pouvoit on la toucher, sans exciter des spasmes; je m'avisai de toucher le scrotum, ou je ne trouvai qu'un seul testicule L'autre etoit remonté et formoit La tumeur en question; La femme qui avoit tenté la reduction s'apperceu de ma surprise et me dit, qu'elle savoit bien que L'enfant n'en avoit qu'un, mais que ce n'étoit pas le premier qu'elle voyoit dans ce cas; je ne pu m'empecher de lui faire connoitre sur le champ son ignorance et sa bevüe, je declarai que ce n'etoit que le testicule qui formoit cette

[BIBLIOTHÈQUE] NATIONALE DE MEDECINE

tumeur, et quil nétoit point question d'hernie: je fis appliquer des cataplasmes anodins, et ensuite des émolliens et resolutifs, en six jours de tems l'inflammation et le gonflement disparurent, et le testicule repris sa situation naturelle.

Je connois aujourdhuy un jeune homme de traize a quatorze ans qui a été obligé de quitter ses etudes a paris et revenir chez ses parens, fort incommodé d'une pretendue hernie, quil dit lui avoir été causée par un coup de pied d'un de ses condisciples, et pour laquelle on lui avoit appliqué un bandage ordinaire il y a plus d'un an; dans l'examen quón en a fait on na trouvé quún seul testicule, celui du coté de la tumeur forme la hernie pretendue. La mere du jeune homme assure tres fort que son fils avoit cy devant deux testicules: on a fait plusieurs saignées, on a appliqué des cataplasmes, tout cela infructueusement, le testicule a vraisembla-blement contracté des adherences qui ne peuvent etre détruites que par une operation particuliere, on sent mieux quon ne peut l'exprimer, le ridicule d'une pareille bevüe.

n° 75.